

- Classification des peupliers -


GÉNÉRALITÉS

- Le genre *Populus* est divisé en 5 sections auxquelles il faut rajouter un groupe d'hybrides intersectionnaux (peupliers interaméricains).
- Les peupliers hybrides (signe : X) sont traités comme des espèces pures.
- Un clone regroupe les individus reproduits par bouturage à partir d'un seul arbre (tête de clone).
- Un cultivar est un clone cultivé couramment et désigné par le signe c.v.

Exemple de nomenclature

GENRE	ESPÈCE		CULTIVAR ou clone
Populus	Nigra	C.V	'Pourtet'
Populus X	euraméricana	C.V	'I.214'
Populus X	interaméricana	C.V	'Unal'

GÉNÉALOGIE



Généalogie des principaux cultivars rencontrés en Poitou-charentes



CLASSIFICATION

SECTIONS	REMARQUES	ESPÈCES	VARIÉTÉS/CULTIVARS
1ère section LEUCE	Peupliers trembles (Europe et Amérique)	<i>Populus tremula</i>	
	Peupliers blancs	<i>Populus alba</i> (une espèce collective)	var. 'Nivea' var. 'Hickeliana'
	Hybrides (<i>P tremula</i> x <i>P alba</i>)	<i>Populus canescens</i> (Peuplier grisard)	
2ème section TACAHAMA CA	Appelés aussi peupliers baumiers	<i>Populus simonii</i>	c.v. 'Obtusata'
		<i>Populus yunnanensis</i>	
		<i>Populus trichocarpa</i> .	c.v. 'Fritzi Pauley' c.v. 'Columbia River'

