


- Le Peuplier : quelques définitions -

- Le vocabulaire courant
- Les maladies
- La généalogie

VOCABULAIRE

APICAL (E) :	se dit de la partie qui forme le sommet d'un organe (ex : pousse terminale d'un arbre).
CHARPENTIÈRE :	branche maîtresse.
CHLOROSE :	trouble nutritionnel causé par une carence du végétal en un ou plusieurs éléments. Provoque jaunissement et/ou nécrose des feuilles.
CORDIFORME :	à base échancrée  en forme de cœur.
DÉBOURREMENT :	phase d'ouverture de bourgeons avec apparition et début de développement des jeunes feuilles.
ENTRE-ECORCE :	inclusion d'écorce au niveau de l'intersection des tissus d'une branche et des tissus du tronc.
ÉTIAGE :	débit ou niveau d'eau le plus faible en été.
FEUILLE : Différentes parties	
HOUPPIER :	ensemble des ramifications (branches et rameaux) d'un arbre et de la partie du tronc non comprise dans le fût.
HYDROMORPHE :	se dit d'un sol évoluant dans un milieu engorgé par l'eau de façon périodique ou permanente.


LANCÉOLÉ :	 <p>en forme de fer de lance.</p>
LIMBE :	partie plate et élargie de la feuille.
OVOÏDE :	en forme d'œuf.
PETIOLE :	“queue” de la feuille.
PHOTOTROPISME :	orientation préférentielle des organes végétaux (tiges et rameaux) vers la lumière.
PLANÇON :	plant sans racines (bouture).
PLASTIQUE :	se dit d'une espèce ayant une grande amplitude écologique à l'égard de plusieurs facteurs (sol notamment).
PORT :	silhouette caractéristique de l'arbre.
RHYTIDOME :	partie morte et externe de l'écorce du tronc caractérisée par des formes (crevasses, plaques...) et des couleurs spécifiques.
RUSTIQUE :	se dit d'une espèce ayant des exigences réduites vis-à-vis du sol et des entretiens.
SEXE :	<ul style="list-style-type: none"> - peuplier mâle : ♂ - peuplier femelle : ♀
STATION :	terrain homogène dans ses conditions physiques et biologiques.
TEXTURE :	ensemble des caractéristiques d'un sol ou d'un horizon définis par la taille et la proportion de ses constituants.
XYLOPHAGE :	qui se nourrit de bois.

MALADIES

CHANCRE BACTERIEN :	lésion évolutive du tronc résultant d'une activité bactérienne.
CLOQUE :	affection foliaire d'origine cryptogamique.
CYTOSPORA CHRYSOSPERMA :	affection foliaire d'origine cryptogamique maladie de faiblesse.
DOTHICHIZA POPULEA :	affection d'origine cryptogamique sur rameaux et tiges - maladie de faiblesse.
MARSSONINA BRUNEA :	affection foliaire d'origine cryptogamique.
ROUILLES :	affections foliaires d'origine cryptogamique. Trois principaux types de rouille concernant les peupliers : - <i>Melampsora larici populina</i> (rouille du Méléze). Cinq races = E1/E2/E3/E4/E5. - <i>Melampsora allii populina</i> (rouille de l'ail). - <i>Melampsora médusae</i> .
TACHES BRUNES :	(maladie des) : affection d'origine cryptogamique atteignant le tronc (nécrose).
VIRUS DE LA MOSAIQUE :	affection foliaire d'origine virale.
PUCERON LANIGERE :	insecte présent sur tronc et branches pouvant entraîner le dépérissement des arbres.

Haut de page

GÉNÉALOGIE



- Les Peupliers hybrides (signe X) sont traités comme des espèces pures.
- Le clone regroupe les individus reproduits par bouturage ou autre voie végétative à partir d'un seul arbre. (tête de clone).